

## NGHIÊN CỨU VỀ NHIỄM *PARVOVIRUS* TRÊN CHÓ TẠI PHÒNG KHÁM THÚ Y PETCa-ř THÁI NGUYÊN

*Đặng Thị Mai Lan<sup>1</sup>, Đoàn Kiều Hưng<sup>2</sup>, La Văn Công<sup>1</sup>, Đặng Thị Bích Huệ<sup>3</sup>*

### TÓM TẮT

Kết quả kiểm tra 728 con chó bệnh được mang đến Phòng khám Thú y PetCa-rê Thái Nguyên cho thấy có 316 con mắc bệnh đường tiêu hóa (chiếm tỷ lệ 43,41%), 128 chó mắc bệnh đường hô hấp (17,58%), 104 chó mắc ký sinh trùng (14,29%). Trong số 316 con chó mắc bệnh đường tiêu hóa có 203 chó mắc bệnh Parvo, chiếm tỷ lệ 64,24%. Các giống chó ngoại có tỷ lệ mắc bệnh Parvo (31,12%) cao hơn chó nội (22,54%) và chó lai (27,88%). Tỷ lệ chó mắc bệnh Parvo ở 6 tuần đến 3 tháng tuổi là cao nhất, chiếm 37,50%; tỷ lệ thấp nhất (15,52%) là ở chó trên 6 tháng tuổi. Chó mắc bệnh Parvo có những triệu chứng lâm sàng đặc trưng như: mệt mỏi, ủ rũ, bỏ ăn, sốt kèm theo nôn mửa, tiêu chảy, phân lẫn máu, cùng với các bệnh tích rõ rệt ở đường tiêu hóa và nội quan. Tỷ lệ nhiễm bệnh Parvo ở chó không phụ thuộc vào giới tính.

*Từ khóa:* Chó, *Parvovirus*, nôn mửa, tiêu chảy ra máu, bệnh đường tiêu hóa.

### Study on *Parvovirus* infection in dogs at PetCa-ř Clinic, Thai Nguyen

*Dang Thi Mai Lan, Doan Kieu Hung, La Van Cong, Dang Thi Bich Hue*

### SUMMARY

The result of testing 728 disease dogs at the PetCa-ř Veterinary Clinic, Thai Nguyen showed that there were 316 dogs suffered from gastrointestinal diseases (43.41%), 128 dogs suffered with the respiratory diseases (17.58%), 104 dogs suffered with the parasitic diseases (14.29%). Among 316 gastrointestinal disease dogs, there were 203 dogs infected with *Parvovirus* (64.24%). The rate of the exotic dogs infected with *Parvovirus* disease was higher (31.12%) than that of the indigenous dogs (22.54%) and the hybrid dogs (27.88%). The *Parvovirus* incidence of dog at 6 weeks to 3 months old was highest (37.50%), at over 6 months old was the lowest (15.52%). The diseased dogs presented the typical symptoms, such as: fatigue, moodiness, loss of appetite, fever accompanied by vomiting, diarrhea, bloody stools together with significant lesions in the gastrointestinal tract and internal organs. The *Parvovirus* incidence in dog was not depended on male or female.

*Keywords:* Dogs, *Parvovirus*, vomiting, bloody diarrhea, gastrointestinal disease.

<sup>1</sup> Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

<sup>2</sup> TT Giống vật nuôi Thái Nguyên, Phòng khám thú y PetCa-rê Thái Nguyên

<sup>3</sup> Phòng khám thú y PetCa-rê Thái Nguyên