

TÌNH HÌNH ĐỀ KHÓ Ở CHÓ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ PHÒNG KHÁM THÚ CUNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thu Trang, Phạm Thị Phương Lan,
Nguyễn Thị Minh Thuận, Nguyễn Tuấn Vũ, Đào Văn Nam*

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

**Tác giả liên hệ email: Nguyenthutrang@tuaf.edu.vn*

TÓM TẮT

Theo dõi các chó đẻ khó tại 3 phòng khám thú cưng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên cho thấy đẻ khó xảy ra trên nhiều giống chó, trong số đó nhóm chó Poodle chiếm tỷ lệ cao nhất (50,62%). Chủ yếu đẻ khó xảy ra chó nhỏ hơn 2 tuổi (64,20%) và ở lứa đẻ đầu tiên (45,68%). Những biểu hiện lâm sàng của chó mắc bệnh đẻ khó gồm: ra sản dịch màu xanh/ xanh đen, hôi (59,26%); rặn yếu/ không rặn (39,51%); làm ổ, bồn chồn, thở mạnh, kêu la, rặn liên tục nhưng thai không ra (29,63%); đẻ con ở nhà hơn 2 giờ nhưng không đẻ tiếp (20,99%); lòi ối, thai kẹt âm đạo (18,52%). Trong 81 trường hợp chó đẻ khó thì can thiệp bằng phẫu thuật chiếm tỷ lệ cao nhất (67,90%), can thiệp bằng thuốc chiếm 20,99% và can thiệp bằng tay chiếm 14,81%. Tỷ lệ thành công của các can thiệp này lần lượt đạt 98,18%; 88,24% và 83,33%. Tai biến sau phẫu thuật chiếm tỷ lệ 14,55% trong 55 ca phẫu thuật, trong đó có 3 chó mẹ bị đứt chỉ đường khâu và 4 trường hợp bị nhiễm trùng vết mổ, 1 trường hợp bị chết, chiếm tỷ lệ lần lượt là 5,45%; 7,27% và 1,82%.

Từ khóa: Chó, đẻ khó, dấu hiệu, can thiệp, tỉnh Thái Nguyên.

Dystocia in dog and intervention effectiveness at some pet clinics in Thai Nguyen city

*Nguyen Thu Trang, Pham Thi Phuong Lan,
Nguyen Thi Minh Thuan, Nguyen Tuan Vu, Dao Van Nam*

SUMMARY

The result of monitoring dystocia in dogs at 3 pet clinics in Thai Nguyen city showed that dystocia occurred in many dog breeds, of which Poodle dogs accounted for the highest rate (50.62%). Most dystocia occurred in dogs under 2 years of age (64.20%) and in first-time giving births (45.68%). Clinical signs of dystocia in dogs included: amniotic fluid with green/greenish-black colour, bad smell (59.26%); weak push (39.51%); nesting behavior, restlessness, heavy breathing, crying, continuous push without delivering the dog baby (29.63%); giving births at home for more than 2 hours and then stop (20.99%); prolapsed amniotic sac, or can not giving out dog baby (18.52%). Among the 81 cases of dystocia, surgical intervention accounted for the highest rate (67.90%), followed by pharmacine intervention (20.99%) and by hand intervention (14.81%). The success rates of these interventions were 98.18%, 88.24%, and 83.33%, respectively. Post surgical complications occurred in 14.55% of 55 surgical cases, including 3 dogs with suture line rupture, 4 infections at the surgical site, and 1 death, corresponding to 5.45%, 7.27%, and 1.82%, respectively.

Keywords: Dogs, dystocia, signs, intervention, Thai Nguyen province.