

BỆNH SINH SẢN Ở BÒ SỮA SAU SINH CHĂN NUÔI TẠI TRANG TRẠI

*Nguyễn Hoàng Khang¹, Nguyễn Thị Bích Liên²,
Nguyễn Thủy Nguyễn³, Lê Bảo Duy³, Nguyễn Thị Thương^{3*}*
*Tác giả liên hệ email: thuong.nguyenthi@hcmuaf.edu.vn

TÓM TẮT

Đề tài này được thực hiện nhằm khảo sát tỷ lệ các bệnh thường gặp ở bò sữa sau sinh tại trang trại, đánh giá tỷ lệ bệnh sinh sản trên bò sữa sau sinh và hiệu quả điều trị. Kết quả khảo sát đã ghi nhận có 220 ca bệnh, với 95 ca tại trang trại ở Thành phố Hồ Chí Minh và 125 ca tại trang trại ở tỉnh Lâm Đồng. Tỷ lệ bò mắc bệnh liên quan đến sinh sản chiếm cao nhất (53%), kế đến là bệnh tiêu hóa (23%), bệnh hô hấp (15%) và bệnh chân khớp (9%). Viêm tử cung, sót nhau được xem là tình trạng bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất; lần lượt là 33,33% và 28,89% trong nhóm bệnh sinh sản. Tỷ lệ bệnh sinh sản thay đổi ở lứa đẻ, bò tơ có tỷ lệ bệnh cao nhất (35,56%) và giảm dần qua các lứa đẻ. Hiệu quả điều trị các bệnh liên quan sinh sản đạt 95,56% và tỷ lệ bò loại thải là 4,44% trong tổng số các ca bệnh khảo sát.

Từ khóa: Bệnh sinh sản, bò sữa, ketosis, sót nhau, viêm tử cung.

Postpartum reproductive diseases in dairy cows raised on farms

*Nguyen Hoang Khang, Nguyen Thi Bich Lien,
Nguyen Thuy Nguyen, Le Bao Duy, Nguyen Thi Thuong*

SUMMARY

The study was carried out to investigate the rate of common diseases in postpartum dairy cows on the farms, to evaluate the rate of reproductive diseases and the treatment effectiveness. The investigated results recorded 220 disease cases including 95 cases in Ho Chi Minh City and 125 cases in Lam Dong province. The rate of reproduction diseases was the highest (53%), followed by digestive diseases (23%), respiratory diseases (15%), and leg and joint diseases (9%). Metritis and retained placenta were considered to be the most common diseases, accounting for 33.33% and 28.89%, respectively, in the reproductive disease group. The rate of reproductive diseases changed by litter, heifers had the highest rate (35.56%), decreasing gradually through the litters. The treatment efficiency of reproductive-related diseases reached 95.56%, and the elimination rate was 4.44% in our study.

Keywords: Dairy cows, ketosis, reproductive disease, metritis, retained placenta.

¹. Chi cục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

². Phân hiệu Gia Lai, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

³. Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh