

# KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ VÀ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HỖ TRỢ BỆNH GIẢM BẠCH CẦU TRÊN MÈO DO FELINE PANLEUKOPENIA VIRUS (FPV) TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

*Lê Ngọc Mẫn<sup>1</sup>, Trần Ngọc Bích<sup>2\*</sup>, Huỳnh Trường Giang<sup>2</sup>,  
Thạch Võ Trung Hiếu<sup>3</sup>, Trần Hữu Hoà<sup>3</sup>, Đặng Thị Mỹ Tú<sup>4</sup>*

*\*Tác giả liên hệ email: tnbich@ctu.edu.vn*

## TÓM TẮT

Kết quả khảo sát 1.161 con mèo đã được đưa đến khám tại Bệnh xá Thú y, Trường Đại học Cần Thơ và Phòng khám Thú y Phúc Hiền, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2024, bằng phương pháp chẩn đoán lâm sàng và sử dụng bộ kit test dfu EASY TEST (FPV Ag) cho thấy tỷ lệ mèo nhiễm FPV là 32,47% trên tổng số mèo nghi nhiễm. Mèo suy giảm bạch cầu do FPV có triệu chứng điển hình xuất hiện như: Ỉ rừ, mệt mỏi (100%), sốt (96%), chảy dãi (88%), tiêu chảy - phân lẫn máu (80%), bỏ ăn, ói và niêm mạc nhợt nhạt (72%). Các yếu tố nguy cơ làm gia tăng tỷ lệ mắc bệnh giảm bạch cầu trên mèo gồm: nhóm tuổi, tình trạng tiêm phòng, phương thức nuôi. Đánh giá phác đồ điều trị hỗ trợ bệnh giảm bạch cầu trên mèo được thực hiện trên 15 cá thể dương tính với FPV cho kết quả khỏi bệnh chiếm 33,33%; thuyên giảm chiếm 20% và không khỏi bệnh chiếm 46,67%.

*Từ khóa:* Bệnh xá thú y, FPV, mèo, hiệu quả điều trị hỗ trợ.

## Survey on epidemiological characteristics and effectiveness of supportive treatment regimen for feline panleukopenia caused by feline panleukopenia virus (FPV) in Ninh Kieu district, Can Tho city

*Le Ngoc Man, Tran Ngoc Bich, Huynh Truong Giang,  
Thach Vo Trung Hieu, Tran Huu Hoa, Dang Thi My Tu*

## SUMMARY

The result of surveying 1,161 cats brought to the Veterinary Clinic, Can Tho University and Phuc Hien Veterinary Clinic, Ninh Kieu District, Can Tho city from May to October 2024 through clinical diagnosis and using the dfu EASY TEST (FPV Ag) test kit, showed that the rate of cats infected with FPV was 32.47% on total number of suspected cats with FPV. The cats with FPV-induced leukopenia had typical symptoms such as: lethargy, fatigue (100%), fever (96%), drooling (88%), diarrhea - bloody stools (80%), anorexia, vomiting and pale mucous membranes (72%). Breed and gender factors did not affect the incidence of FPV. The result of the supportive treatment regimen for 15 FPV-positive individuals showed that 33.33% cured, 20% remissed and 46.67% were not cured.

*Keywords:* Veterinary clinic, FPV, feline, efficacy of supportive treatment.

<sup>1</sup>. Trường Đại học Tiền Giang

<sup>2</sup>. Khoa Thú y, Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ

<sup>3</sup>. Sinh viên ngành Thú y, Trường Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ